

2013年4月に改訂しました。(記載要領変更*および住所変更に伴う改訂**)

第3類
医薬品

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように大切に保存して下さい。

生薬製剤 **ヨクイニン錠**

【使用上の注意】

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
消化器	腹痛
皮 膚	発疹

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

下痢
- 3ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【成分・分量】 1日量(12錠)中

「日局」ヨクイニン末 ……………3000mg

なお、添加物として無水リン酸水素カルシウム、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム、クロスカルメロースナトリウム、バレイショデンプン、乳糖を含みます。

【効能・効果】 イボ、皮膚のあれ

【用法・用量】 次の量を食間又は空腹時に温湯にて服用して下さい。 (食間とは、食後2～3時間を指します。)

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	4錠	3回
15歳未満	服用しないで下さい	

※用法・用量を厳守して下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- 乾燥剤は薬がなくなるまで捨てないで下さい。
- 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出るがありますが、効果には変わりありませんので安心して服用して下さい。
- ビンの中につめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いて下さい。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

***【お問い合わせ先】 伸和製薬株式会社 情報管理室
〒116-0003 東京都荒川区南千住5丁目17番8号
電 話：03(3807)3780
受付時間：9時から17時まで(土・日曜、祝日を除く)

*** 発 売 元 **伸和製薬株式会社**
東京都荒川区南千住5丁目17番8号

製造販売元 **松浦薬業株式会社**
名古屋市長区大高町寅新田36